

Monographie de produit

SOLVET

Téléphone 1-403-456-2245

Sans frais : 1-877-456-2755

Télécopieur : 1-403-271-2920

Site Internet : www.solvvet.ca

Courriel : info@solvvet.ca



Tous les efforts ont été faits pour assurer l'exactitude de l'information ci-incluse. Toutefois, les lecteurs ont la responsabilité de se familiariser avec l'étiquette du produit canadien ou la notice dans l'emballage.

AVL ELECTROLYTE POWDER

Électrolytes oraux en poudre

Pour usage vétérinaire seulement

DIN: 02384248

MISES EN GARDE : Garder hors de la portée des enfants.

INGRÉDIENTS ACTIFS : Chaque 76 g contient :

Dextrose	41,734 g
Chlorure de sodium	3,507 g
Glycine	6,756 g
Chlorure de potassium	1,940 g
Acétate de sodium	13,125 g
Phosphate de sodium monobasique	0,600 g
Phosphate de dipotassium	0,349 g
D-pantothénate de calcium	0,012 g
Osmolarité de la solution reconstituée	428 mOsm/L

INDICATIONS : Pour aider dans le traitement et de la prévention de la déshydratation, du déséquilibre en électrolyte, de l'acidose et qui agit comme source supplémentaire de nutriments chez les veaux nouveaux souffrant de diarrhée. AVL Electrolyte Powder est conçu pour une absorption maximum lors de l'administration orale.

Monographie de produit

POSOLOGIE ET ADMINISTRATION : Dissoudre 76 g (1 mesurette) dans deux (2) litres d'eau tiède (37 °C) et administrer tout le volume à la bouteille ou avec une sonde gastrique. Répéter le traitement deux (2) à trois (3) par jour, au besoin, ou selon les recommandations d'un vétérinaire. La solution ne doit pas nuire à la digestion du lait et elle peut être administrée aux veaux qui tètent ou qui sont nourris à la main. Lorsqu'elle est reconstituée conformément aux directives, la solution procure environ :

Na+	112,5 mEq/L
K+	15 mEq/L
H+	6 mEq/L
Cl-	43 mEq/L
Phosphate	10,5 mEq/L
Acétate*	80 mEq/L
Glycine	45 mMol/L
Dextrose	116 mMol/L

*Une fois métabolisée, cela est équivalent à 80 mEq/L de bicarbonate.

Bien agiter avant l'utilisation. Jeter la solution inutilisée après 24 h.

CONTRE-INDICATIONS : Ne pas utiliser lors d'obstructions gastro-intestinales supérieures ou chez des animaux moribonds.

PRÉCAUTION : S'il n'y a aucune amélioration dans les premiers 48 à 72 heures, consulter un vétérinaire.

ENTREPOSAGE : Conserver à 25 °C ou moins. Protéger de l'humidité. Garder le contenant bien fermé. Éviter le gel.

PRÉSENTATION: 76 g, 2 kg, 4 kg, 10 kg

CODE DE PRODUIT : EP76, EP2, EP4, EP10