

Monographie de produit

SOLVET

Téléphone : 1-403-456-2245

Sans frais : 1-877-456-2755

Télécopieur : 1-403-271-2920

Site Internet : www.solvvet.ca

Courriel : info@solvvet.ca



Tous les efforts ont été faits pour assurer l'exactitude de l'information ci-incluse. Toutefois, les lecteurs ont la responsabilité de se familiariser avec l'étiquette du produit canadien ou la notice dans l'emballage.

CALCI-MAG-PHOS-DEXTROSE

Solution injectable de calcium, magnésium, phosphore et dextrose

Usage Vétérinaire Seulement

Stérile

DIN: 02518872

MISES EN GARDE: Un délai d'attente pour la viande et une période de retrait pour le lait ne sont pas requis quand les directives de l'étiquette sont suivies. Garder hors de la portée des enfants.

INGRÉDIENTS ACTIFS:

Gluconate de calcium monohydrate (équivalent à 21,6 mg/ml de calcium)	20,55% p/v
Hypophosphite de calcium (équivalent à 5,0 mg/ml de phosphore)	1,37% p/v
Gluconate de magnésium dihydraté	5,8% p/v
Dextrose monohydraté	15,0% p/v

Milliéquivalents par 100 mL:

Cations:		Anions:	
Calcium	107,8 mEq	Borogluconate	117,3 mEq
Magnésium	25,6 mEq	Hypophosphite	16,1 mEq
Total	133,4 mEq	Total	133,4 mEq

INGRÉDIENTS INACTIFS: Acide borique, eau pour l'injection USP, colorant caramel, acide chlorhydrique, hydroxyde de sodium.

INDICATIONS: Pour aider au traitement de la fièvre vitulaire et d'autres carences en calcium, en glucose, en magnésium et en phosphore chez les bovins, les moutons, les chevaux et les porcs adultes.

Monographie de produit

POSOLOGIE ET ADMINISTRATION: Pour une administration intraveineuse, sous-cutanée ou intrapéritonéale chez les bovins, les moutons et les porcs et pour une administration uniquement intraveineuse chez les chevaux. Réchauffer la solution à la température du corps avant l'administration. Lors de l'injection sous-cutanée, répartir la dose à différents sites d'injections. Injecter lentement et de manière aseptique. Masser pour faciliter l'absorption.

Bovins et chevaux adultes	250-500 mL
Moutons et porcs adultes	50-125 mL

Répéter dans plusieurs heures si nécessaire ou comme recommandé par un vétérinaire. S'il n'y a pas d'amélioration notable après 24 à 36 heures ou moins selon la gravité de l'affection traitée, consulter votre vétérinaire. Surveiller attentivement l'état de l'animal.

PRÉCAUTIONS: Ne contient aucun agent de conservation. Utiliser seulement si la solution est limpide. Ne pas conserver une bouteille qui a déjà été utilisée.

ENTREPOSAGE: Entreposer entre 15°C et 30°C. Protéger du gel. Protéger de la lumière.

Fabriqué pour: SOLVET, 7226 107ave SE, Calgary (AB), Canada, T2C 5N6

PRESENTATION: 500 mL

CODE PRODUIT: 900073